

第一章 緒論 1-4

第一節 研究緣起

台灣地區青少年藥物濫用及愛滋病感染問題，已漸漸受到社會大眾的關注。其中，以藥物濫用的情況而言，在法務部、教育部及行政院衛生署在「九十一年反毒報告書」中指出，在 40 家辦理藥癮戒治之精神醫療院所通報之 3,534 名藥物濫用個案中，所濫用的藥物種類以海洛因(63.9%)、(甲基)安非他命(42.0%)、FM2 安眠鎮靜劑(7.4%)及強力膠(6.5%)為主；而年齡層部份又以 20-29 歲佔全體個案中的 53.8%最多，10-19 歲亦佔全體個案中的 6.0%，不容小覷。然，國內愛滋病帶原者人數，目前發現在 20-29 歲，有漸增的趨勢(衛生署，2003)。就長遠的觀點而言，愛滋病的潛伏期長達十年(涂醒哲，1995)，由潛伏期來判斷這些年輕人愛滋病病例，很可能於青少年期間感染(章新瑞，2003)，目前每五個新感染者就有一位是青少年，其中新感染者當中有約 20%是 15-24 歲的高中、大學年齡層(衛生署，2003)。面對國內青少年藥物濫用及感染愛滋傳染病等問題，若不及早從教育著手，這樣的社會問題將會嚴重影響到整體國家發展，對社會也會產生不利的影響。

青少年藥物濫用問題是當前先進國家普遍會遇到的社會問題，而台灣目前青少年藥物濫用問題也持續亮起紅燈，藥物濫用的問題，已朝全球化趨勢發展，而吸食人口年輕化、吸食毒品種類多樣化、新興毒品不斷創新及吸食方式複雜化等情況，也使國內反毒策略面臨挑戰。因此藥物濫用的防制工作必須加強預防工作，教導青少年認識藥物，拒絕毒品的誘惑，並協助青少對非法藥物的需求。

愛滋病議題亦是目前世界各國面臨的重大問題之一。根據聯合國世界衛生組織「HIV/AIDS in Asia and Pacific region 2001」公布報告指出：至少有五成以上注射毒品的藥物濫用者，經由與他人共用注射針頭、針筒或施打毒品而感染愛滋病。研究指出，近來青少年在 19 歲以前的男女有性經驗的比率增加、多重性伴侶、不常採用或不使用保險套、青少年開始嘗試性活動和藥物經驗，並傾向否定自己有健康上的危險等，使他們處於潛在感染 HIV 的危險之中，有些專家甚至還認為青少年可能是下一波流行的主流(Hoffmann, 1989)。

為此，實有必要深入校園來瞭解目前學生藥物濫用情況及對愛滋病的認知，以提供藥物濫用教育施政基準及愛滋病防治教育參考，同時針對現況，對未來提出對藥物濫用防制及愛滋病防治教育的具體可行建議。