

【高教】

東京大學將確認3,000名入學新生是否曾經接受預防注射(朝日新聞2008年1月4日刊登)

由於日本年輕一代去年春季流行麻疹，東京大學決定對今年4月入學之3,000名新生確認是否曾經打過預防針，藉使學生自我警覺。大學確認學生是否打過預防針算是個首例，勢必引起其他大學廣泛注意。

確認項目包括肺結核、日本腦炎等7種定期預防針注射及流行性耳下腺炎、傷風、水痘等經常注意注射之9種。確認方法是事先將申報表件寄給錄取新生，使其確認母子健康手冊等事項後於4月入學時提出。對於麻疹一項，未曾打過預防針或只打過一次者應於入學前接受注射。如果無法自我確認是否打過的人，須於入學後接受抗體檢查。

由於去年春季流行麻疹時，只打過一次預防針的10~20歲年輕人無法完全保證能否免疫，加上週期性復發會再度流行。因此，厚生勞動省修正預防注射法施行法規，規定自新學年度開始5年內，國中1年級與高中3年級必須各打一次預防針，而只打過一次之小學2年級以上之學童，至高中畢業前還須打針一次。

厚生勞動省表示，去年4~7月，全國有263所學校因學生患有麻疹而被迫停課。其中大學有83所、高中有73所，約佔6成。東京大學雖然沒有停課，但有1、2年級學生罹患。另外去年夏天實施免費打預防針時，約有600人接受注射。

現在高中3年級算是最後一次接受注射之年齡。東京大學健保中心的上原譽志夫准教授表示，「採隔離學生之效果並不大，應徹底要求打預防針才能控制」。